

ENQUETE SEDATION EN FIN DE VIE EN REA

Sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès (SPCMD)
au décours d'une limitation ou d'un arrêt des thérapeutiques (LAT)
en réanimation-USC en France



POUR PARTICIPER
recherche@sfar.org

RATIONNEL

La SPCMD est **un droit des malades** en fin de vie.
Si les modalités décisionnelles sont précisées dans
la loi, **les modalités pratiques sont mal connues.**

METHODOLOGIE

- ✓ Etude Observationnelle descriptive multicentrique rétrospective
- ✓ Début des inclusions au premier trimestre 2021
- ✓ Durée de la période d'inclusion et de l'étude : 6 mois

OBJECTIFS

PRINCIPAL Décrire les pratiques sédatives au décours des
décisions de LAT à partir de 4 items

- ✓ Le choix des agents sédatifs administrés
- ✓ Les modalités d'administration
- ✓ L'association aux analgésiques
- ✓ Les modalités de surveillance et d'évaluation

SECONDAIRES

- ✓ Comparer les pratiques sédatives, c'est-à-dire la SPCMD
vs. les sédations dites proportionnées
- ✓ Evaluer les modalités décisionnelles de la SPCMD

RECUEIL DE DONNEES

INCLUSION 10 derniers patients décédés au décours
d'une décision de LAT avant 01/01/2020
Non inclusion: EME, ACR inattendu

REMPLISSAGE D'UN eCRF RedCAP

- ✓ Caractéristiques de l'unité (une seule fois par centre)
- ✓ Caractéristiques du patient
- ✓ Caractéristique des pratiques sédatives